



1- Objet et domaine d'application

Ces prélèvements consistent à recueillir les crachats par expectoration pour recherche de bactéries responsables d'une pathologie broncho-pulmonaire.

2- Déroulement du prélèvement

- Se procurer un **poudrier stérile (bouchon rouge)** au **Centre de Prélèvement du Centre Ambulatoire du Mâconnais** ou dans une pharmacie.
- Se laver la bouche à l'eau afin d'éliminer un maximum de salive.
- Effectuer le prélèvement le matin, **à jeun**.
- Se laver les mains avant et après prélèvement.
- Mettre des gants à usage unique si possible.
- Prendre des mouchoirs papier pour s'essuyer la bouche.
- Prélever le crachat émis par la toux spontanée ou après manœuvre kinésithérapique facilitant l'expectoration (ne pas prélever la salive) ou après traitement par aérosol, dans un **poudrier stérile**.
- Chez le nourrisson, aspirer les sécrétions avec un aspirateur à mucosités et boucher le flacon.
- Remarque : pour une recherche de tuberculose (BK), répéter l'examen **3 jours de suite**.
- **ATTENTION : Si analyse bactériologique + recherche de BK-Mycobactéries, prélever 2 pots différents**

Transport

- Noter sur les flacons son nom, prénom et sa date de naissance. Indiquer qu'il s'agit de « crachats ».
- Amener le prélèvement **rapidement (dans les 2 heures)** au Centre de Prélèvement avec l'ordonnance du médecin prescripteur. Se munir également de ses cartes Vitale et de mutuelle.
- Conserver le flacon **au réfrigérateur s'il ne peut pas être amené immédiatement au Centre de Prélèvement**.